

Médecin Référent
Service Hôpital
Nom de naissance Nom d'usage Prénom
Date de Naissance Sexe
Pays de Naissance/Origine ethnique
Consanguinité : Oui ☐ Non ☐
Autres membres de la famille avec la même pathologie (joindre un arbre généalogique)
Age de découverte de la tubulopathie proximale
Circonstances de ouverte

Phénotype au moment du diagnostic :

	SANG		URINES			
		Unités	Échantillon	Unités	24 h	Unités
Na*		mmol/L		mmol/L		mmol
K*		mmol/L		mmol/L		mmol
HCO3*		mmol/L		mmol/L		
Cl		mmol/L		mmol/L		
Protides		g/L				
Créatinine		μmol/L		mmol/L		
Ac Urique*		μmol/L		mmol/L		
Ca*						
PO4						
Mg*		mmol/L		mmol/L		
PTH			Polyurie : Oui ☐ Non ☐ Diurèse de 24 heures..... Pouvoir de concentration des urines après dDAVP :mOsm/kg			
25OH VitD						
1-25OH2VitD						
TRP						

Protéinurie tubulaire : β2 globuline ☐ α1 microglobuline ☐ RBP ☐
 Valeurmg/mmol de créat. Albuminurie mg/mmol de créat
 Glycosurie : Oui ☐ Non ☐ Aminoacidurie: Oui ☐ Non ☐
 Clearance de l'Acide Urique Cytraturie : Unités.....
 Néphrocalcinose : Oui ☐ Non ☐ Néphrolithiase : Oui ☐ Non ☐
 Si Oui, âge de découverte : Si Non, dernière recherche :
 Traitement

Faits marquants pendant l'évolution

Retard de Croissance : Oui ☐ Non ☐ Rachitisme : Oui ☐ Non ☐
 Actuellement : Poids Taille TA
 Créatinine plasmatiqueμmol/L
 K plasmatiquemM si hypokaliémie : kaliurèse
 ChlorémiemM Bicarbonates PmM Phosphorémie
 Rénine Aldostérone
 Calciurie Magnésémie(SVP mettre les unités)
 Si hypomagnésémie : magnésurie :
 Commentaires